



MALMÖ HÖGSKOLA

Rökstopp vid kirurgi

- Hur ser praxis ut inom tandvården i region Skåne?

Lina Holmbom

Sara Nyhlén



Aktuellt ämne!



Lite bakgrundsfakta

- ▶ Ingår i Sveriges kommuner och landstings satsning på ökad patientsäkerhet - obligatoriskt
- ▶ Rankas som högsta prioritet av socialstyrelsen - laglig rätt att neka ingrepp
- ▶ 4-8 veckors rökstopp minskar postoperativa komplikationer med ca 50 %
- ▶ Mottas oftast positivt av patienterna
- ▶ Hög andel rökfria patienter ett år efter ingreppet
- ▶ Många vinster och positiva effekter

Frågeställningar


- ▶ Erbjuder tandvårdspersonal sina patienter hjälp med rökstopp inför kirurgi?
- ▶ Vill tandläkare tillämpa denna praxis?
- ▶ Hur mottas/bemöts rökstopp från tandvårdspersonal och patienter?
- ▶ Finns resurser för att erbjuda alla patienter hjälp med rökavvänjning?
- ▶ I hur stor utsträckning förekommer det att vårdgivare säger nej till att utföra ingrepp om patienten inte tar ett rökuppehåll?



Tillvägagångssätt

► Enkätundersökning

- Folktandvården region Skåne
- Privattandvården region Skåne



Resultat


- ▶ 75% av de tillfrågade anger att de erbjuder hjälp med rökstopp inför kirurgi



Resultat


► 5 veckor innan operation

6-8 veckor	7	35 %
4-5 veckor	2	10 %
2-3 veckor	6	30 %
Övriga	5	25 %



► 6 veckor efter operation

6-8 veckor	8	44 %
4-5 veckor	2	11 %
2-3 veckor	2	11 %
Övriga	6	33 %



Resultat

Svarsgivarna uppger att:

- ▶ Ca hälften antar erbjudandet om hjälp med rökstopp
- ▶ Komplikationerna minskar med ca 60%




Resultat

- ▶ Majoriteten av vårdgivarna anger att de kan vägra att utföra ett ingrepp om patienten inte tar ett rökuppehåll



Resultat

- ▶ 80 % av tandvårdspersonalen anges ha en positiv inställning till rökstopp vid operation



Tänkvärt...

- ▶ Få kliniker inkluderade i studien
- ▶ Endast specialister mottog enkäten
- ▶ Alla deltagare besvarade inte samtliga frågor
- ▶ Enbart motiverade svarsgivare?

Tack!

